

Культура	Заболевание	Коэффициент разбавления	Приблизительный объем жидкости	Период использования (Последнее применение)	Количество применений	Способ применения	Общее допустимое количество применений препаратов на основе Тиофанат-метила
Мандарин	Бородавчатость	В 30 раз	8л / 10а	С апреля по июнь	Не более 5 раз	Распылить в воздухе	Не более 8-ми раз. (Распылять, в том числе при помощи беспилотных устройств и авиатехники не более 5-ти раз. Смазывать не более 3-х раз.)
	Ботритис серый (серая плесень), Бородавчатость	В 1000-1500 раз	200 ~700л/ 10а	За день до сбора урожая	Не более 5 раз	Распылить	
	Антракноз, Гоммоз, Фитофтороз, Тристеза, Черная пятнистость, Голубая и зеленая плесень, головчатая плесень.	От 2000 до 3000 раз					
Цитрусовые (кроме мандаринов)	Антракноз, Гоммоз Фитофтороз, Тристеза, Черная пятнистость, Голубая, зеленая, головчатая плесень	От 2000 до 3000 раз	200 ~700л/ 10а	За день до сбора урожая	Не более 5 раз	Распылить	Не более 8-ми раз. (Распылять не более 5-ти раз. Смазывать не более 3-х раз.)
Яблоки	Мучнистая роса, Парша, Аскохитоз	От 1500 до 2000 раз	200 ~700л/ 10а	За день до сбора урожая	Не более 6-ти раз	Распылить	Не более 10-ти раз. (Смазывать не более 3-х раз. Поливать рассаду не более не более 1-го раза. Опрыскивать не более 6-ти раз.)
	Монилиоз, Гниль коры, Лишайники	В 1000-1500 раз					
	Кольцевая гниль Сажистая гниль	В 1500 раз					
	Белая корневая плесень, Мукор	От 500 до 1000 раз	---	Период покоя-Вегетационный период	1 раз	Полить	
Рис посевной	Гибберелла Фуджикурои Фузариоз колоса	В 30 раз	---	До или после вымачивания семян перед посевом	1 раз	Замочить семена на 10 минут	Не более 3 раз (Обработка семян не более 1 раза).
		От 300 до 500 раз			1 раз	Замочить семена от 6 до 24 часов	
Пшеница озимая	Тифулез	От 2000 до 2500 раз	60 ~150л/ 10а			Распылить	

	Склеротиноз	В 1000 раз	25ℓ/10а	До того как ляжет снег			Не более 4 раз (Обработка семян не более 1 раза. После колошения не более 2-х раз. При распылении, в том числе при помощи беспилотных устройств, общее количество распылений не должно составлять более 3-х раз.)	
		От 250 до 500 раз						
	Бурая ржавчина, Фузариоз, Септориоз, Красная плесень	В 250 раз	60 ~150ℓ/ 10а	За 14 дней до сбора урожая				Не более 3-х раз (После колошения не более 2-х раз)
		От 1000 до 1500 раз						
	Мучнистая роса	В 2000 раз						
Церкоспореллез, Корневая гниль, пятнистость	В 1000 раз							
Зерновые Рожь Ячмень	Тифулез , Белая гниль	От 2000 до 2500 раз	60 ~150ℓ/ 10а	До того как ляжет снег	Распылить	Не более 3-х раз (Обработка семян не более 1 раза. После колошения не более 1 раза.)		
	Бурая ржавчина, Фузариоз, Септориоз, Красная плесень	От 1000 до 1500 раз		За 30 дней до сбора урожая			Не более 3-х раз (После колошения не более 1 раза)	
	Мучнистая роса	В 2000 раз						
	Церкоспореллез, Корневая гниль, пятнистость	В 1000 раз						
Персик	Мучнистая роса	В 1000 раз	200 ~700ℓ/ 10а	За день до сбора урожая	Не более 6-ти раз	Распылить		Не более 10-ти раз. (Смазывать не более 3-х раз. Опрыскивать во время покоя не более 1-го раза, во время вегетации не более 6-ти раз.)
	Гниль плода	От 1000 до 1500 раз						
Груша	Белая корневая плесень	От 500 до 1000 раз	---	В период покоя	1 раз	Полить	Не более 11-ти раз. Смазывать не более 3-х . Во время покоя распылять не более 1-го. Полив рассады не более 1-го раза. Распылять во время вегетации не более 6-ти .	
	Лишайники, Аскохитоз, Фомопсис	От 1000 до 1500 раз	200 ~700ℓ/ 10а	За день до сбора урожая	Не более 6-ти раз	Распылить		
	Мучнистая роса, Альтернариоз, Сажистый грибок	От 1500 до 2000 раз						

Саженьцы Яблоко, Груша Персик, Шелковица	Белая корневая гниль	В 500 раз	---	Перед посадкой	1 раз	Вымочить корни в течении 10-ти минут	Не более 6-ти раз
Виноград	Горькая гниль	От 1000 до 1500 раз	200 ~700л/ 10а	За 45 дней до сбора урожая	1 раз	Распылить	Не более 5-ти раз. (Смазывать не более 3-х раз. Во время покоя не более 1-го раза. Во время вегетации не более 1-го раза.)
	Антракноз, Гниль лозы	В 1000 раз					
	Черная пятнистость, Мучнистая роса, Серая плесень	От 1500 до 2000 раз					
Хурма	Мучнистая гниль, Корневая гниль, Серая гниль, Черная пятнистость, Фузариоз	От 1000 до 1500 раз	200 ~700л/ 10а	За день до сбора урожая	Не более 6- ти раз	Распылить	Не более 10-ти раз. (Смазывать не более 3-х раз. Во время покоя распылять не более 1-го раза. Распыление во время вегетации не более 6-х раз.)
Баклажаны	Антракноз, Альтернариоз, Склеротиниоз	От 1500 до 2000 раз	100~300L/10а.	За день до сбора урожая	Не более 5-ти раз	Распылить	Не более 6-ти раз. (Обработка семян не более 1-го раза. После посадки не более 5-ти раз.)
Томаты	Серая гниль	100~200g/10а	5L/10а	За день до сбора урожая	Не более 5-ти раз	Распылить дымом при комнат. темпер., в закрытом помещении (теплица и т.п.)	Не более 6-ти раз. (Обработка семян 1 раз. После посева не более 5-ти раз.)
	Фузариозное увядание, Фомоз, Мучнистая роса, Антракноз, Серая и белая гнили	От 1500 до 2000 раз	100~300L/10а	За день до сбора урожая	Не более 5-ти раз	Распылить	Не более 6-ти раз. (Обработка семян 1 раз. После посева не более 5-ти раз.)
Брокколи	Белая гниль, Серая гниль	В 2000 раз	100~300L/10а	За 14 дней до сбора урожая	Не более 2-х раз	Распылить	Не более 3-х раз. (Обработка семян не более 1-го раза. После посева не более 2-х раз.)

Картофель	Макроспориоз, Фитофтороз	От 1000 до 1500 раз	100~300L/10a	За 7 дней до сбора урожая	Не более 5-ти раз	Распылить	Не более 5-ти раз. (Обработка клубней не более 1-го раза.)
Капуста	Черная ножка	В 1000 раз	100~300L/10a	За 3 дня до сбора урожая	Не более 2-х раз	Распылить	Не более 3-х раз. (Обработка семян не более 1-го раза. После посева не более 2-х раз.)
	Белая гниль, Серая гниль	От 1500 до 2000 раз					
Огурцы	Мучнистая роса, Аскохитоз, Бактериоз, Кладоспориоз, Мозайка	От 1500 до 2000 раз	100~300L/10a	За день до сбора урожая	Не более 5-ти раз	Распылить	Не более 6-ти раз. (Обработка семян не более одного раза. Опрыскивание после посева не более 5-ти раз.)
Арбуз	Склеротиния, Фузариоз, Антракноз	От 1500 до 2000 раз	100~300L/10a	За день до сбора урожая	Не более 5-ти раз	Распылить	Не более 6-ти раз. (Обработка семян не более одного раза. После посадки не более 5-ти раз.)
Лук репчатый	Серая гниль	В 500 раз	---	До посадки	Не более 6-ти раз.	Вымочить корневище в течение 5-ти минут	Не более 7-раз. Обработка семян не более 1-го раза. Вымачивание корней не более 1-го раза. Опрыскивание не более 5-ти раз. При помощи беспилотных устройств не более 3-х раз.
	Пероноспороз, Шейковая гниль, Альтернариоз, Корневая гниль, Серая гниль	От 500 до 1000 раз	100~300L/10a	За день до сбора урожая	Не более 6-ти раз. (Не более 5-ти раз после посадки.)	Распылить	
Кабачок	Мучнистая роса	В 1500 раз	100~300L/10a	За день до сбора урожая	Не более 3-х раз	Распылить	Не более 4-х раз. (Обработка семян не более одного раза. После посадки не более 3-х раз.)
Клубника	Мучнистая роса	В 1500 раз	100~300L/10a	До 21 го дня до сбора урожая	Не более 3-х раз	Распылить	Не более 4-х раз. (Обработка рассады не более одного раза. После посадки не более 3-х раз.)
	Мучнистая роса	В 1000 раз	---	До того как розетки будут		Вымочить корневище в	

				помещены на хранение		течение 5-ти минут.	
	Фузариозное увядание	От 300 до 500 раз	3L/m ²	Во время выращивания рассады или перед посадкой		Вымочить саженец в растворе в течение одного часа. Или полить.	
Цикламен Розы Лилия	Мучнистая роса, Чёрная пятнистость, Ржавчина, Серая гниль	От 1500 до 2000 раз	100~300L/10a	---	Не более 5-ти раз	Распылить	Не более 5-ти раз.